

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!



В данном выпуске журнала обсуждаются различные аспекты нейрогериатрии. Как известно, неврологические проблемы отмечаются более чем у 70% людей пожилого и старческого возраста. Одной из самых частых проблем нейрогериатрии являются когнитивные и эмоциональные

нарушения.

В оригинальных исследованиях можно ознакомиться с данными о роли витамина D в возникновении депрессии, полученными в когортном исследовании долгожителей центрального региона Российской Федерации.

Несколько оригинальных исследований посвящено когнитивным расстройствам. В частности, приведены данные диагностической ценности теста Мини-Ког у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 65 лет и старше. Также представлены результаты валидации русской версии опросника-теста GPCOG.

Известно, что по мере старения популяции растет распространенность как когнитивных расстройств, так и сахарного диабета 2 типа. При этом у когнитивно сниженных пациентов одной из важных проблем является возникающая гипогликемия, чему посвящен обзор литературы.

Самой частой причиной выраженных когнитивных расстройств (деменции) у людей пожилого и старческого возраста является болезнь Альцгеймера. Как своевременно выявить и лечить болезнь Альцгеймера, вы также узнаете из данного выпуска.

У гериатрических пациентов часто выявляются различные дефицитарные состояния, в частности недостаток витамина B12, который играет важную роль в развитии неврологических заболеваний. В представленном обзоре приведены основные признаки дефицита витамина B12 и схема его коррекции.

Учитывая распространенность сосудистых факторов риска среди пожилого населения, врачи часто сталкиваются с сосудистым поражением головного мозга, которое приводит к возникновению сосудистых когнитивных расстройств. Как распознать по данным МРТ и как оптимизировать фармакотерапию сосудистого поражения головного мозга, вы узнаете из представленных статей в данном номере.

Кроме того, в отдельном материале представлен новый способ стратификации риска аортокоронарного шунтирования у пациентов старческого возраста на основании параметров функционального статуса.

Мы продолжаем предоставлять нашим читателям актуальную, полезную информацию и знания по различным клиническим аспектам ведения пациентов старшего возраста. Надеемся, что материалы данного номера журнала будут интересны не только гериатрам и неврологам, но и терапевтам, кардиологам, эндокринологам и другим специалистам.

С уважением, О.Н. Ткачева